



## ՈՐՈՇ ԴԵՐՄԱՏՈՉՆԵՐՈՎ ՅԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՏԻԳՄԱՏԻՉԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

**1,2 Բաբայան Կ.,<sup>2</sup> Մկրտչյան Ա.,<sup>1</sup> Մանուկյան Է.,<sup>1</sup> Դովհաննիսյան Յ.**

<sup>1</sup> Երևանի Մ. Զերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի կոսմետոլոգիայի, դերմատոլոգիայի սեռական ուղիներով փոխանցվող ինֆեկցիաների ամբիոն, Երևան, Հայաստան

<sup>2</sup> Դերմատոլոգիայի և սեռական ուղիներով փոխանցվող ինֆեկցիաների գիտա-բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Քրոնիկ դերմատոզով 118 հիվանդների հետազոտության ժամանակ (տղամարդ՝ 76, կին՝ 42), այդ թվում պսորիազով՝ 53, տեղային ճաղատությամբ՝ 32 և քորվոզ դերմատոզով՝ 33, 73,3 % դեպքում, հայտնաբերվել է ստիգմատիզացիայի բարձր աստիճան:

Հաստատված է, որ կանանց շրջանում ստիգմատիզացիայի հաճախականությունը նշանակալի բարձր է, քան՝ տղամարդկանց: Նոզոլոգիական պլանում հայտնաբերված է, որ ստիգմատիզացիան տոկոսային մեծամասնությամբ նկատվում է պսորիազով պացիենտների մոտ, հետո՝ տեղային ճաղատությամբ տառապողների, և քիչ փոքր՝ քորվոզ դերմատոզով հիվանդների մոտ:

Անցկացվող հոգեչափական հետազոտությունները, որոնք հետապնդում են որոշակի քանակի խնդրի հետապնդում և անհատա-պահվածքային առանձնահատկությունների ու նրանց փոխկապակցվածության հայտնաբերումը, լրացրեց գոյություն ունեցող պատկերացումները՝ քրոնիկ դերմատոզով պացիենտի անձնային գործոնի դերի մասին:

Սահմանված են ներքին փոխադարձ կապերը՝ անձնային տեսակների և ստիգմատիզացիայի նախանշանների միջև, տրված է ալեքսիտիմիկ տեսակի անհատի բնութագիրը՝ ինչպես ստերիոտիպ ցուցանիշ հոգեսոմատիկ մեխանիզմների գենեզում, պսորիազի կլինիկական, օջախային ալոպեցիայի և քորվոզ դերմատոզների